

脳卒中ジェスチャースクリーニングテスト (STGS)

実施日: / 実施者:

氏名: 利き手: 実施手: 右・左・両手 失語: 無・有 認知症: 無・有

採点方法) 誤反応なく1回目で完遂出来た:10点, 完遂出来たが2回目又は誤反応有り:5点, 完遂出来ない:0点, 2回まで施行可能, 最長観察15秒まで

口頭指示								
①無意味ジェスチャー								
指示方法	採点			誤反応				
以下の文章を口頭で提示	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①鼻の頭に人差し指を置いてください								
②頭の上に手のひらをのせてください								
③親指と人差し指で反対の耳をつまんでください								

②有意味ジェスチャー								
指示方法	採点			誤反応				
以下の文章を口頭で提示 注) ピースの理解困難時 じゃんけんの対対応	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①ピースサインをしてください								
②軍隊の敬礼をしてください								
③おいでおいでをしてください								

③物品使用動作								
指示方法	採点			誤反応				
以下の文章を口頭で提示	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①鉛筆を持ったつもりで字を書くまねをしてください								
②はさみを持ったつもりで紙を切るまねをしてください								
③歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをしてください								
④コップを持ったつもりで水を飲むまねをしてください								

その他の誤り
無反応 無定型 関節の位置の誤り 動作の取り違い
使用手の誤り 左右の誤り 失語の影響 身体部位の誤り

小括

模倣								
①無意味ジェスチャー								
指示方法	採点			誤反応				
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示) 「私のまねをしてください」	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①鼻の頭に人差し指を置く								
②頭の上に手のひらをのせる								
③親指と人差し指で反対の耳をつまんでください								

②有意味ジェスチャー								
指示方法	採点			誤反応				
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示) 「私のまねをしてください」	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①ピースサイン								
②軍隊の敬礼								
③おいでおいで								

③物品使用動作								
指示方法	採点			誤反応				
以下の動作を模倣してもらおう(同時呈示) 「私のまねをしてください」	10点	5点	0点	BPO	関節の誤り	拙劣さ	修正行為	保続
①鉛筆を持ったつもりで字を書くまねをする								
②はさみを持ったつもりで紙を切るまねをする								
③歯ブラシを持ったつもりで歯を磨くまねをする								
④コップを持ったつもりで水を飲むまねをする								

その他の誤り
無反応 無定型 関節の位置の誤り 動作の取り違い
使用手の誤り 左右の誤り 失語の影響 身体部位の誤り

小括

	口頭指示		模倣		総計		総括
	右	左	右	左	右	左	
無意味	/30	/30	/30	/30	/60	/60	● Cut-off値: 145/150 (145以下は障害あり)
有意味	/30	/30	/30	/30	/60	/60	
物品使用	/40	/40	/40	/40	/80	/80	
合計	/100	/100	/100	/100	/200	/200	
MMSE: FAB: STEF: 右) 左)							